

校園有蛇 師生注意

軍訓室溫馨滿報

多一分認識 少一分傷害

104.06.17

18

校園遇到蛇請先冷靜。蛇是一種變溫動物，當氣溫較高時，蛇的代謝率高，活動頻繁，大致上，從春末到初冬，是蛇活動的黃金季節，尤其夏季及天高氣爽的日子。發現蛇類出沒時應立即通知校安中心或總務處人員處理，千萬不要任意靠近，避免發生危險。

如何預防蛇咬傷？

1. 夏秋時節儘量避免至草叢及灌木叢，必要時穿高桶鞋及戴手套，以防蛇咬傷。
2. 不要隨便進入竹林或矮樹林中，若要進入，最好隨身帶帽子及棍棒，撥弄枝葉，利用打草驚蛇，給予它們足夠的脫逃時間，就不會反咬你一口。
3. 不要隨便撿拾草地上、溪流邊或樹林下，任何枝狀物、石頭、花草或翻動石塊及其他廢棄物品，都有可能遭到蛇的攻擊。

若有發現，請告知校安中心：03-5922285

多一分認識、少一分傷害：毒蛇咬傷



台灣陸上毒蛇常見有6種，其中有兩種為神經性毒蛇（飯匙倩（又名眼鏡蛇）及雨傘節），三種為出血性毒蛇（龜殼花、赤尾蛇（又名赤尾青竹絲）、百步蛇）及一種混合性毒蛇（鎖鏈蛇）以下針對蛇咬傷的症狀、處置加以說明。

(一)咬傷的症狀：

(1)出血性毒蛇（龜殼花、赤尾蛇（又名赤尾青竹絲）、百步蛇）：

- 1.傷口灼痛、局部腫脹並擴散
- 2.起水泡、瘀斑、紫斑、漿液或血液由傷口滲出
- 3.皮膚或皮下組織壞死
- 4.噁心、發燒、嘔吐
- 5.出血（如：流鼻血、牙齦出血、血尿、腸胃道出血、腦部出血等）
- 6.瞳孔縮小、低血壓、抽搐、痙攣

(2)神經性毒蛇（飯匙倩（又名眼鏡蛇）、雨傘節）：

- 1.傷口疼痛、局部腫脹
- 2.瞳孔散大
- 3.嗜睡、運動神經失調、眼瞼下垂
- 4.局部無力、顎咽麻痺、口吃、垂涎
- 5.噁心、嘔吐、昏迷
- 6.呼吸困難、呼吸衰竭

(二)緊急處理

- 1.認清蛇的形狀、顏色及其他特徵，在無法或尚未鑑定出有毒或無毒的情況下，一律以有毒毒蛇咬傷的狀況進行急救處理。
- 2.使患者保持靜臥，勿移動受傷部位，保持靜止，盡量使傷口部位低於心臟位置。
- 3.因患肢會腫脹，應儘速除去戒指、手鐲等束縛物。
- 4.儘速以彈性繃帶緊緊包紮患肢，包紮範圍越大越好。如無彈性繃帶時，絲襪、褲襠亦可應用，再利用木板或樹枝等物做成夾板，以固定患肢。
- 5.注意並維持被咬傷病人的生命徵象，尤其是呼吸是最重要的生命之所繫
- 6.儘速送醫接受診治或使用抗蛇毒血清治療。
- 7.禁忌：◎切忌切開傷口或活（移）動患肢。◎切忌冰敷或飲用刺激性物質（如咖啡或酒）。◎切忌使用止血帶。◎切勿用嘴巴嘗試吸出毒液。

